

لقاحات كوفيد-19

الأسئلة المتكررة للآباء والأوصياء،

والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا المؤهلين لتلقي لقاح فايزر

س: هل هناك لقاحات متوفرة للأطفال أو المراهقين؟

ج: نعم. منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لقاح فايزر، وهو أحد لقاحات كوفيد-19، ترخيصًا بالاستخدام للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر. وقد حظي لقاح فايزر بأكثر نصيب من التجارب السريرية في التاريخ، حيث أجريت التجارب على أكثر من 43 ألف مشاركًا طوعيًا. ويُصرح حاليًا باستخدام لقاحي مودرنا وجونسون أند جونسون لمن هم في سن 18 عامًا فأكثر.

س: هل موافقة أحد الوالدين/الوصي مطلوبة؟

ج: نعم. يجب أن يحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والخاضعين للوصاية على موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني على التطعيم. ويجب على الوالد أو الوصي القانوني بشكل عام مرافقة القاصر لتلقي اللقاح، ما لم يتم إعطاء اللقاح في عيادة طبيب أو في عيادة مدرسية أو تابعة للمدرسة أو في مكان مشابه.

س: هل لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة؟

ج: نعم، لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، ففي التجربة السريرية التي أُجريت على لقاح فايزر بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، لم تحدث حالات إصابة بكوفيد-19 بين 1100 طفل تلقوا اللقاح، وكانت هناك 16 حالة إصابة بين 1100 طفل في مجموعة الدواء الوهمي. وقد أظهرت التجربة أيضًا أن الشباب الذين تلقوا التطعيم لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة في دمائهم، مما يشير إلى أنهم طوروا مناعة وقائية قوية.

س: ما المدة الزمنية التي يستغرقها اللقاح حتى يعمل؟

ج: لقاح فايزر عبارة عن سلسلة من جرعتين. ويلزم تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا (ثلاثة أسابيع) من الجرعة الأولى. وكلا الجرعتان ضروريتان لتحقيق أقصى قدر من الوقاية. ويعتبر الشخص محصنًا بالكامل بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية.

س: ما هي الآثار الجانبية للقاحات كوفيد-19؟

ج: تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا ألمًا أو احمرارًا أو تورمًا في موضع الحقن؛ حمى وقشعريرة أو أقيهما؛ صداع؛ تعب؛ آلام في العضلات أو المفاصل. وتعتبر هذه الآثار الجانبية طبيعية وهي علامة على أن جسمك يكون استجابة مناعية لوقايتك من كوفيد-19. وعادةً ما تستمر الآثار الجانبية بضعة أيام فقط، وقد تزداد مع الجرعة الثانية.

س: هل ستغير لقاحات كوفيد-19 الحمض النووي للإنسان؟

ج: لا. لن تغير لقاحات كوفيد-19 الحمض النووي لأي شخص. حيث يحتوي لقاح فايزر على الحمض النووي الريبوزي المرسل (mRNA). ويزود الجسم بتعليمات لصنع السطح غير ضار أو البروتين السنبلي الموجود في الفيروس المسبب لكوفيد-19؛ ويستجيب الجسم عن طريق بناء الأجسام المضادة لتدمير البروتين السنبلي.

س: هل سيتم زرع شريحة تتبع دقيقة في أجسام الأشخاص عبر لقاحات كوفيد-19؟

ج: لا، لا تحتوي حقن اللقاح على شرائح تتبع.

س: هل تسبب لقاحات كوفيد-19 العقم أو تؤثر على خصوبة الطفل في المستقبل؟

ج: لا، لا يوجد حاليًا أي دليل على أن أي لقاحات، بما في ذلك لقاحات كوفيد-19، تسبب مشاكل في الخصوبة.

س: كيف يمكنني تحديد موعد؟ أين يمكن تطعيم الشباب؟

ج: هناك مئات من المواقع التي يمكن فيها تطعيم الشباب في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك عيادات أطباء الأطفال وعيادات اللقاحات ومديريات الصحة المحلية والمستشفيات والمراكز الصحية المجتمعية وغيرها. ومع ذلك، يجب إخطار آباء الأطفال البالغين 12 عامًا من العمر أنه وفقًا لقانون الولاية الحالي، يجب أن يحصل الأطفال البالغين 12 عامًا من العمر أو أقل على وصفة طبية حتى يمكن تطعيمهم في صيدلية؛ ويمكن تطعيمهم في أي مكان باستثناء الصيدلية. ولا يحتاج الشباب الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر إلى وصفة طبية، وقد يتلقون لقاح كوفيد-19 في صيدلية أو عند أي موفر لقاح آخر مدرج على موقع gettheshot.coronavirus.ohio.gov. لم يصدر بعد تشريع يسمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 12 عامًا بتلقي لقاح كوفيد-19 أو لقاح الأنفلونزا في صيدلية بدون الحصول على وصفة طبية. وستظل الوصفات الطبية مطلوبة لجميع التطعيمات الأخرى لهذه الفئة العمرية. وقد وافق أعضاء مجلس النواب في أوهايو ومجلس شيوخ أوهايو على مشروع القانون. وبمجرد توقيع حاكم الولاية على مشروع القانون، سيدخل حيز التنفيذ على الفور.

س: ما الذي يجب على طفلي فعله قبل موعد التطعيم؟

ج: يجب أن يتناول الطعام ويشرب الكثير من الماء قبل تلقي التطعيم. وهذا مهم بشكل خاص للأطفال والمراهقين لأن [الإغماء بعد أي لقاح شائع بين المراهقين أكثر من البالغين،، وغالبًا ما يكون نتيجة للقلق الشديد أو الجفاف](#). احصل على قسط وافر من الراحة في الليلة السابقة لموعده إن أمكن. وارتد قميصًا قصير الأكمام أو بلا أكمام للسماح بالوصول إلى أعلى الذراع بسهولة. وإذا كان الجو باردًا، فضع سترة أو جاكيت يسهل خلعها بسرعة.

س: ماذا أفعل إذا كان طفلي يشعر بالقلق؟

ج: اطلب من طفلك أن يتنفس ببطء وعمق قبل تلقي الحقنة وأن يفكر في شيء يبعث على الاسترخاء. ويجب عليه تجنب النظر إلى الحقنة، وإرخاء الذراع في موضع تلقي الحقنة. ويمكن للوالدين اتخاذ خطوات بسيطة للمساعدة في تحضير طفلهم للتطعيم وجعل التجربة أقل إجهادًا. ويمكن للوالدين تهدئة أطفالهم من خلال تذكيرهم بالتنفس بعمق أو إلهاءهم بالتحدث معهم أثناء تلقيهم اللقاح.

س: لقد اطلعت على الكثير من الشائعات حول اللقاحات على وسائل التواصل الاجتماعي. كيف أحصل على المعلومات الصحيحة؟

ج: الإنترنت مليء بالمعلومات الخاطئة الخطيرة حول لقاحات كوفيد-19، وقد يكون من الصعب معرفة ما يمكن الوثوق به. وأفضل ما يمكنك القيام به هو تثقيف نفسك بشأن اللقاحات بمعلومات من مصادر جديرة بالثقة. تعرف على المزيد حول [العثور على معلومات موثوقة عن اللقاح في هذا المقال الصادر عن CDC](#) وتعرف على كيفية التفرقة بين الخرافات والحقائق على هذه الصفحة التابعة لمديرية الصحة بولاية أوهايو.

هل لديك المزيد من الأسئلة حول كوفيد-19؟

[الأسئلة المتكررة | الخرافات مقابل الحقائق | ما الذي يجب معرفته قبل وأثناء وبعد تلقي لقاح كوفيد-19](#)
تم التحديث في 12 مايو 2021.