



## Скрининг слуха у новорожденных Информация при домашних родах

Слух и общение очень важны для развития вашего ребенка. Младенцы, рожденные дома, не обязаны проходить скрининг слуха. Тем не менее, очень важно рассмотреть возможность проверки слуха у вашего ребенка.

Нарушения слуха часто встречаются у младенцев и новорожденных, и их трудно обнаружить. Потеря слуха незаметна, ее признаки часто можно пропустить, пока ребенок не станет старше. Некоторыми признаками потери слуха могут быть задержка речевого развития, проблемы с поведением и (или) задержки развития.

### Почему скрининг слуха новорожденного важен для моего ребенка?

Скрининг слуха вскоре после рождения ребенка — это быстрый и простой способ выявить риски потери слуха. Скрининг слуха необходимо проводить вскоре после рождения ребенка; его можно провести, когда ребенок спит или спокоен.

### Где мой ребенок может пройти скрининг слуха у новорожденных?

Ваш местный департамент здравоохранения предложит вам список мест, в которых можно пройти скрининг слуха у новорожденных. Этот список называется «Каталог педиатрических аудиологических услуг амбулаторного обследования слуха».

### Как мне записаться на прием для прохождения скрининга слуха у новорожденного?

Обратитесь к «Каталогу педиатрических аудиологических услуг», в котором поставщики услуги амбулаторного обследования слуха представлены по округам. После того, как вы найдете подходящих поставщиков, вы можете позвонить по указанному номеру, чтобы назначить встречу для скрининга слуха у новорожденного. Также существует список страховок, которые принимают в каждом учреждении.



## Что делать, если результат скрининга слуха неудовлетворительный, и ребенок нуждается в дополнительном обследовании?

После проведения скрининга слуха новорожденного аудиолог поделится с вами результатами и предоставит вам важную информацию о развитии вашего ребенка. Если результат скрининга неудовлетворительный, необходимо провести дополнительное тестирование — диагностическое измерение остроты слуха.

Диагностическое измерение остроты слуха рекомендуется провести как можно раньше. Лучше всего это сделать в возрасте до 3 месяцев. Младенцы в возрасте до 6 месяцев могут спать во время тестирования. Детям в возрасте старше 6 месяцев может понадобиться седативное средство, чтобы они могли спать во время тестирования.

Иногда диагностическое измерение остроты слуха можно пройти в том же месте, где проводят скрининг. Если же там нельзя выполнить диагностическое измерение остроты слуха, аудиолог предоставит вам «Каталог педиатрических аудиологических услуг амбулаторного обследования слуха» со списком мест, где это можно сделать, или поможет записаться на диагностическое измерение остроты слуха.

## Что делать, если у моего ребенка потеря слуха?

Если обнаружена потеря слуха, аудиолог может отправить вашего ребенка к врачу-отоларингологу. Ваш ребенок также будет направлен в программу раннего вмешательства, где вашей семье будет оказана поддержка в улучшении процессов познания и развития вашего ребенка путем выполнения повседневных действий.

## К кому я могу обратиться, если у меня возникнут вопросы?

Программа обследования слуха у младенцев Департамента здравоохранения штата Огайо может ответить на вопросы о скрининге, диагностическом измерении остроты слуха, а также предоставить другую информацию.

## Контакты программы обследования слуха у младенцев Департамента здравоохранения штата Огайо:

- Помощь по скринингу слуха у младенцев: (614) 387-0135
- Помощь по диагностическому измерению остроты слуха у младенцев: (614) 728-4676
- Эл. почта: [infanthearingprogram@odh.ohio.gov](mailto:infanthearingprogram@odh.ohio.gov)
- <https://www.odh.ohio.gov/odhprograms/cmh/Infant%20Hearing/About%20Infant%20Hearing.aspx>



**Ohio**  
Department of Health